

2017-2018절기

어린이 인플루엔자 예방접종 안내문



올해는 더 편하게 겨울건강 준비하세요~

**다가오는 9월 4일부터 가까운 동네 병·의원에서도
인플루엔자 예방접종이 무료 시행됩니다.**

어린이 인플루엔자 예방접종 지원사업

- **사업대상** : 생후 6~59개월 이하 어린이(2012. 9. 1. ~ 2017. 8. 31. 출생아)
※ 어린이 지원대상자는 접종일 기준 생후 6개월 이상인 경우 접종 가능
※ 인플루엔자 유행기간을 고려해 '18.2월까지 생후 6개월(17.8.31.이전 출생아)이 도래하는 어린이를 '18.4월까지 지원
- **접종기관** : 지정의료기관 및 일부 보건소
※ 지역별 보건소 이외 지정의료기관은 질병관리본부 예방접종도우미 홈페이지(<https://nip.cdc.go.kr>) > 일반인(자세히보기) > 예방접종도우미에서 확인하시기 바랍니다.
- **접종횟수** : 1회 또는 2회
- **무료 예방접종 일정**
 - 지정 의료기관 : '17. 9. 4. (월) ~ '18. 4. 30. (월)
 - 보건소 : '17. 9. 4. (월) ~ '18. 4. 30. (월) (잔여 백신이 있는 경우 백신 소진 시 까지)
 - 2회 접종 대상자 : '17. 9. 4. (월)부터 접종 시작
 - 1회 접종 대상자 : '17. 9. 26. (화)부터 접종 시작
- 적절한 면역획득을 위해 2회 접종이 필요한 어린이는 최소 1개월 간격으로 2회 접종을 완료하기 위하여 9.4일부터 접종을 시작합니다.(무료 예방접종 일정을 준수하여 접종하여 주시기 바랍니다.)
* 과거접종기록은 질병관리본부 예방접종도우미 홈페이지(<https://nip.cdc.go.kr>) 회원가입 후 → 아이정보등록 → 아이 예방접종 내역조회에서 확인 가능합니다.
- 인플루엔자 예방접종을 처음받는 경우(또는 접종력을 모르는 경우) 2회 접종
- 16-17절기에 인플루엔자 접종을 처음 받았으나 1회 접종만 한 경우 2회 접종
- 그 외 과거 인플루엔자 접종력에 따라 접종 횟수가 다를 수 있으니, 꼭 접종 전 의사와 상담하여 접종 횟수 확인 후 접종하시기 바랍니다.

이런분들은 예방접종을 받아서는 안됩니다!

- 과거 백신 접종 후 중증 알레르기 반응이 있었던 경우
- 백신 성분에 중증 알레르기 반응이 있었던 경우

※ 인플루엔자 백신접종 후 5주 이내 길랭-바레 증후군이나 다른 신경계 증상이 있었다면 예방접종 시 주의가 필요합니다.





예방접종 전·후 주의사항

- 예방접종 전 반드시 의사의 예진을 받아야 합니다.
- 접종 후 20~30분간 접종기관에 머물면서 급성 이상반응 발생 여부를 관찰한 뒤 귀가합니다.
- 귀가 후 적어도 3시간 이상을 주의 깊게 증상을 관찰합니다.
- 접종부위는 청결하게 유지합니다.
- 접종 후 최소 3일간은 특별한 관심을 가지고 관찰하며, 고열이 있거나, 평소와 다른 신체증상이 나타나면 곧 의사의 진료를 받도록 합니다.




예방접종 후 이상반응 대처요령

| 예방접종 후 발생 가능한 이상반응 |

- 국소 이상반응 : 접종부위가 빨갛게 부어오름, 부종, 통증 등
- 전신 이상반응 : 발열, 근육통, 두통 등

| 예방접종 후 이상반응이 생기면 |

- 예방접종 부위의 통증, 빨갛게 부어오름, 부종, 근육통, 발열, 메스꺼움과 같은 경미한 이상반응은 접종 후에 일반적으로 나타날 수 있으며, 대부분 2~3일 이내 호전되므로 걱정하지 않으셔도 됩니다.
- 다만, 증상이 심해지거나 장기간 지속되는 경우, 그 밖에 평소와 다른 심한 전신증상이 나타날 경우 즉시 의사의 진료를 받도록 합니다.



- 예방접종 후 이상반응이 발생하면 관할 보건소 및 의료기관을 통해 신고하실 수 있습니다.
 - 정부에서는 예방접종으로 인한 이상반응 발생 시 예방접종과의 관련성을 심의하여 진료비를 보상하는 「예방접종피해 국가보상제도」를 운영하고 있습니다.
- ※ 「예방접종피해 국가보상제도」 관련 세부사항은 관할 보건소로 문의하시기 바랍니다.



인플루엔자를 예방하는 건강한 생활습관

- 자주 손을 씻고 개인 위생수칙을 잘 지킵니다.
- 기침이나 재채기를 할 때는 손수건이나 휴지, 옷깃 등으로 입을 가리는 기침예절을 지킵니다.
- 인플루엔자가 유행할 때에는 가급적 사람들이 많이 모이는 장소의 방문을 피합니다.
- 인플루엔자 의심 증상이 있는 경우 진료를 받습니다.



예방접종의 모든 것
예방접종 도우미
<http://nip.cdc.go.kr>



질병관리본부 콜센터



위험할 땐 119
힘겨울 땐

